


**LET OP! DEZE INSTRUCTIEKAART IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR FOCETRIA® VAN NOVARTIS.**  
Gebruikt u Pandemrix® van GlaxoSmithKline, raadpleeg dan de betreffende instructiekaart.

# Het gereedmaken en toedienen van FOCETRIA®


Focetria® wordt geleverd in flacons van 5,0 ml. Dit zijn **10 doses van 0,5 ml**.

## STAP 1




Neem een flacon uit de verpakking. Laat de flacon op kamertemperatuur komen. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

## STAP 2




Schud de flacon enkele malen voorzichtig. Het vaccin is dan een homogene, melkwitte vloeistof.

## STAP 3



Controleer de inhoud van de flacon op vreemde deeltjes of duidelijke kleurafwijkingen. Als een van deze afwijkingen wordt gezien, mag het vaccin niet worden gebruikt.


## STAP 4



Alvorens het vaccin toe te dienen, moet men er zeker van zijn dat er geen contra-indicatie bestaat bij de bewuste patiënt.

- ⊗ Schud de flacon enkele malen voorzichtig vóór elke toediening.
- ⊗ Trek in de bijgeleverde spuit (BD Flu+) van 1,0 ml met vaste naald één dosis van 0,5 ml vaccin op uit de flacon.
- ⊗ Dien het vaccin door middel van een **intramusculaire injectie** toe in de bovenarm (Musculus deltoideus) van de patiënt.
- ⊗ Plaats het beschermkapje niet terug op de naald en werp spuit + naald weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
- ⊗ Plak de injectieplaats af met een pleister.

**LET OP!** Indien niet alle 10 doses uit een flacon in één vaccinatie-sessie kunnen worden toegediend, mogen de resterende doses binnen 28 dagen na de toediening van de eerste dosis nog worden gebruikt, mits de flacon gedurende die tijd bij +2°C tot +8°C wordt bewaard. Langer bewaard vaccin moet weggegooid worden. Zodra een dosis vaccin (0,5 ml) in een spuit is opgetrokken, moet deze binnen 15 minuten worden toegediend.



ZO HOUDEN WE  
**GRIP OP GRIEP**

[www.rivm.nl/nieuwe-influenza](http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza)