


# Het gereedmaken en toedienen van PANDEMRIX®

Pandemrix® bestaat uit 2 componenten die gemengd moeten worden:


- A: Een flacon 2,5 ml antigeen (suspensie)
- B: Een flacon met 2,5 ml adjuvans (emulsie)

## STAP 1




Neem één flacon antigeen (flacon A) en één flacon adjuvans (flacon B) uit de verpakking. Laat beide flacons op kamertemperatuur komen. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

## STAP 2




Schud beide flacons enige malen. Flacon A (antigeen) bevat dan een homogene, kleurloze tot melkachtig witte vloeistof (suspensie). Flacon B (adjuvans) bevat dan een homogene witachtige vloeistof (emulsie).

## STAP 3




Controleer de inhoud van beide flacons op vreemde deeltjes of duidelijke kleurafwijkingen. Als een van deze afwijkingen wordt gezien, mag het vaccin niet worden gebruikt.

## STAP 4




Trek de totale inhoud (2,5 ml) van flacon B (adjuvans-emulsie) op in de bijgeleverde BD Pastik spuit van 5 ml. Gebruik hiervoor de bijgeleverde optreksnaal van 0,7 x 35 mm (22G).

## STAP 5




Spuit de opgetrokken 2,5 ml adjuvans-emulsie in flacon A (antigeen).

## STAP 6




Schud het mengsel van adjuvans en antigeen in flacon A goed. Flacon A bevat nu 5,0 ml Pandemrix® vaccin. Dit zijn **10 doses van 0,5 ml**. Verwijder de spuit en naald uit de flacon, plaats het beschermkapje niet terug op de naald en werp alles in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

## STAP 7



Alvorens het vaccin toe te dienen, moet men er zeker van zijn dat er geen contra-indicatie bestaat bij de bewuste patiënt.

- ⊗ Schud de flacon enkele malen voorzichtig vóór elke toediening.
- ⊗ Trek in de bijgeleverde spuit (BD Flu+) van 1,0 ml met vaste naald één dosis van 0,5 ml vaccin op uit de flacon.
- ⊗ Dien het vaccin door middel van een **intramusculaire injectie** toe in de bovenarm (Musculus deltoideus) van de patiënt.
- ⊗ Plaats het beschermkapje niet terug op de naald en werp spuit + naald weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
- ⊗ Plak de injectieplaats af met een pleister.



ZO HOUDEN WE  
**GRIP OP GRIEP**

**LET OP!** Indien niet alle 10 doses in één vaccinatiesessie kunnen worden toegediend, mogen de resterende doses in flacon A binnen 24 uur na de menging van beide componenten worden toegediend, mits flacon A gedurende die tijd bij +2°C tot +8°C werd bewaard. Langer bewaard vaccin moet weggegooid worden. Zodra een dosis vaccin (0,5 ml) in een spuit is opgetrokken, moet deze binnen 15 minuten worden toegediend.