



## Veel gestelde vragen Coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een medisch verhoogd risico

Let op! Als u dit document uitprint, check dan regelmatig of er nieuwe vragen (en antwoorden) op de site van RIVM zijn toegevoegd.

### Welk vaccin krijgen kinderen?

Kinderen krijgen een kinderdosis van het vaccin van Pfizer. Dit is een mRNA vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt en goedgekeurd door het EMA.

Kinderen van 5 t/m 11 krijgen een derde van de werkzame dosis van de hoeveelheid werkzame stof die volwassen krijgen. De afweerreactie van jonge kinderen is bij een lagere dosis even goed als de reactie van (jong) volwassenen op de normale dosis.

### Waarom worden kinderen onder de 12 nu wel gevaccineerd maar eerder niet?

Kinderen met een verhoogd medisch risico hebben grotere kans om door een coronabesmetting in het ziekenhuis te komen. En bij de meeste andere kinderen verloopt COVID-19 zeer mild, maar kan voor een kleine groep ernstig zijn. Zie ook de adviezen van de Gezondheidsraad die door de minister van VWS zijn overgenomen:

- [COVID-19-vaccinatie voor jonge kinderen met verhoogd medisch risico](#)
- [Stel vaccinatie tegen COVID-19 beschikbaar voor 5-11-jarigen](#)

### Is het COVID-vaccin veilig voor kinderen?

In Amerika zijn intussen bijna 5 miljoen kinderen gevaccineerd met het kindervaccin van Pfizer. Bij deze groep is niets gevonden

waaruit blijkt dat het vaccin onveilig is voor kinderen. Ontsteking van de hartspier of het hartzakje (myo- en pericarditis) is niet gezien bij de jonge kinderen.

### Wat zijn de bijwerkingen van het COVID-vaccin bij kinderen?

De meeste bijwerkingen bij kinderen zijn hetzelfde als bij (jong)volwassenen en zijn meestal niet erg. Bijvoorbeeld:

- Pijn op de prikplek
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
- Spierpijn
- Koorts

De bijwerkingen gebeuren vooral in de eerste twee dagen na de vaccinatie. Ook verdwijnen de bijwerkingen meestal binnen 1-2 dagen.

### Kun je onvruchtbaar worden van het vaccin?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de vaccinatie tegen COVID-19 invloed heeft op de vruchtbaarheid.

### Kunnen kinderen nog besmettelijk zijn als ze gevaccineerd zijn?

Als een kind volledig gevaccineerd is kan hij/zij nog besmet raken. Maar de kans dat een kind besmet raakt of anderen besmet is veel kleiner dan wanneer hij/zij niet gevaccineerd is.

### Hoe lang werkt het vaccin?

Op dit moment is nog onbekend hoe lang het vaccin bescherming zal geven.

### Hoeveel prikken heeft een kind nodig?

Kinderen hebben 2 vaccinaties nodig voor goede bescherming tegen corona.

**Een kind heeft al een corona-infectie gehad. Heeft een kind dan 1 of 2 COVID-vaccinaties nodig?**

Ook als een kind corona heeft gehad, is het advies om toch 2 vaccinaties te halen. Dit is nodig voor een zo goed mogelijke bescherming.

**Een kind heeft corona gehad. Wanneer mag hij/zij het vaccin krijgen?**

Is een kind bij de GGD positief getest op corona maar niet ziek geweest van corona? Of had een kind maar lichte klachten en duurde dat minder dan 1 dag? Dan kan er gewoon een afspraak ingepland worden.

Is een kind bij de GGD positief getest op corona en wél ziek geweest? Of had een kind maar lichte klachten maar duurde dit langer dan 1 dag? Dan mag hij/zij de vaccinatie pas krijgen als er minstens 12 weken voorbij zijn sinds de symptomen begonnen.

**Hoeveel tijd zit er tussen de eerste en tweede vaccinatie bij kinderen?**

Als een kind bij de medisch hoog-risico groep hoort, krijgt hij/zij de tweede vaccinatie na 4 weken. Als een kind niet bij de medisch-hoog-risico groep hoort, krijgt hij/zij de tweede vaccinatie na 8 weken.

**Van wie krijgt een kind een uitnodiging voor vaccinatie?**

Als een kind bij een medisch hoog-risico groep hoort, krijgt hij/zij de uitnodiging van de medisch specialist of kinderarts.

Informatie over kinderen zonder medisch hoog-risico komt later.

**Wie geeft de vaccinatie?**

De vaccinaties worden gegeven bij de GGD.

**Een kind heeft ook een oproep of afspraak voor een andere vaccinatie zoals de HPV of de DTP en BMR. Wat moet de ouder/verzorger doen met de uitnodiging voor de coronavaccinaties?**

Plan in dit geval eerst de afspraak voor de andere vaccinatie, en/of laat de afspraak voor die vaccinatie staan.

Er moeten minstens 14 dagen zitten tussen de coronavaccinatie en andere vaccinaties. De ouder/verzorger kan bij de GGD aangeven dat het kind een ander vaccin krijgt.

**Is het veilig om binnen een paar maanden tijd ook andere vaccinaties te krijgen?**

Ja. Het kan geen kwaad om deze vaccinaties in korte tijd te ontvangen. Ons afweersysteem kan op meerdere ziekteverwekkers of vaccins tegelijk reageren. Ook baby's krijgen in korte tijd meerdere vaccinaties tegen verschillende ziektes om hen goed te beschermen.

**Een kind heeft koorts maar geen COVID-infectie. Wanneer mag de COVID-vaccinatie gezet worden?**

Als de koorts onder de 38.5 graden is, mag een kind gewoon gevaccineerd worden. Ook als de koorts een dag eerder nog boven de 38.5 was.

Is de koorts hoger dan 38.5 graden? Wacht dan met de vaccinatie.

**Is de vaccinatie verplicht?**

Nee. Vaccinatie is een vrijwillige keuze.

**Hebben kinderen straks ook een booster nodig?**

Op het moment is het nog niet bekend of kinderen van 5 t/m 11 jaar een boostervaccinatie nodig hebben. Als hier meer over bekend is, zal de Gezondheidsraad hier een advies over uitbrengen.